

Comuníquese con nosotros

Preguntas o molestias urgentes

Telehealth Nursing
651-229-3890

Otras preguntas acerca de su cuidado

Pacientes de St. Paul Clinic:
Línea directa Nurse Call
651-578-5000

Pacientes de otros sitios:
deben comunicarse con su
equipo de atención médica
de Gillette.

Citas
651-290-8707

Libros, DVD, etc.

Encuentre materiales acerca de
las discapacidades, las afecciones
médicas y de apoyo para los
encargados del cuidado.

Recursos de salud y educación

Campus de St. Paul, cerca de
skyway en el cuarto piso

651-229-3938
hre@gillettechildrens.com

Tratamiento en el hogar para las convulsiones prolongadas o agrupadas: benzodiazepinas

Benzodiazepines for Prolonged or Clustering Seizures | Spanish

Educación del paciente

DIS087-SP

¿Que son las benzodiazepinas?

Las benzodiazepinas son una clase de medicina que se usan para tratar las convulsiones prolongadas o agrupadas. Detienen inmediatamente las convulsiones al volver lento el sistema nervioso central.

A menudo estas medicinas se conocen por sus nombres de marca. Por ejemplo, midazolam también se conoce como Versed, el nombre de marca del fabricante. Las benzodiazepinas que se administran a los niños para el tratamiento de las convulsiones prolongadas o agrupadas incluyen:

- **Lorazepam** (Ativan, Lorazepam Intensol)
- **Midazolam** (Versed)
- **Diazepam** (Valium, Diastat, Lorazepam Intensol)

¿Cómo administro estas medicinas?

Su neurólogo decidirá como administrar la medicina a su hijo. A menudo esto depende de lo rápido que debe actuar la medicamento, si su hijo está lo suficientemente alerta para tragar y si el niño babea profusamente durante las convulsiones. Hay tres formas diferentes de administrar los medicamentos:

- **oral:** en el bolsillo que se forma entre la mejilla y las encías de su hijo
- **intranasal:** en las fosas nasales de su hijo
- **rectal:** en el recto de su hijo

Independientemente del método que utilice, **siempre** administre la medicina:

- exactamente como se lo indicaron
- solo cuando sea necesario

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Las benzodiazepinas causan a los niños somnolencia, mareos y reducción del estado de alerta. En raras ocasiones, los niños se pueden volver hiperactivos o irritables (gruñones) durante algún tiempo. Los efectos secundarios más comunes incluyen:

- irritación nasal
- mal sabor de boca
- sensación de frío o calor en la nariz o garganta

¿Cuándo debo pedir ayuda o ir a la sala de emergencias?

La mayoría de los siguientes efectos secundarios son poco comunes, pero si ocurren, pueden ser indicación de un problema grave. Llame de inmediato al neurólogo de su hijo o llévelo a la sala de emergencias si presenta alguno de estos efectos secundarios:

- problemas para respirar
- debilidad grave
- convulsiones que no se detienen

¿Cómo debo guardar la medicina?

La mejor manera de guardar la medicina depende de sus ingredientes.

- **Lorazepam Intensol:** refrigérelo una vez esté abierto el vial.
- **Diazepam gel rectal (Diastat):** manténgalo a temperatura ambiente, alejado de temperaturas extremas de frío o calor.
- **Midazolam:** protéjalo de la luz guardándolo en una bolsa de papel café o en una bolsa de color ámbar. Mantenga el midazolam alejado de las temperaturas extremas de frío o calor.

Continúa en la siguiente página.

Cualquiera que sea la medicina que usa su hijo:

- nunca lo deje en un automóvil, donde la temperatura se puede poner demasiado caliente o demasiado fría.
- no guarde ningún medicamento vencido. Pregunte al farmacéutico cuál es la mejor manera de desechar los medicamentos vencidos o sobrantes.
- manténgalo alejado de la vista y el alcance de los niños, bajo llave en un lugar seguro. Si un niño toma una sobredosis de esta medicina, es una emergencia médica.

¿Qué más debo verificar?

Debido a que las benzodiazepinas pueden causar mareos o somnolencia, pueden afectar la capacidad de su hijo para tomar buenas decisiones. Observe cuidadosamente cuando su hijo necesite estar alerta para una actividad, tal como subir gradas.

¿Qué directrices de seguridad debo seguir?

- **NO** debe compartir las medicinas con otras personas.
- **SÍ** debe mantener una lista de todas las medicinas, la cual puede compartir con su farmacéutico y todos los proveedores de atención médica.
- **SÍ** debe llamar a su farmacia por lo menos dos días antes de que se agote su medicamento, para tener suficiente tiempo para hacer el pedido del surtido. Siempre mantenga a mano suficiente medicamento de emergencia para las convulsiones en caso de que su hijo lo necesite.

¿Tiene preguntas?

Hable con su enfermera de neurología de Gillette o llame a Telehealth Nursing al 651-229-3890.