

## Comuníquese con nosotros

### Preguntas o molestias urgentes

Telehealth Nursing  
651-229-3890

### Otras preguntas acerca de su cuidado

Pacientes de St. Paul Clinic:  
Línea directa Nurse Call  
651-578-5000

Pacientes de otros sitios:  
deben comunicarse con su  
equipo de atención médica  
de Gillette.

### Citas

651-290-8707

**Fecha de colocación de la sonda G**

## Vea nuestro video



[www.gillettechildrens.org/EDR106](http://www.gillettechildrens.org/EDR106)

## Libros, DVD, etc.

Encuentre materiales acerca de las discapacidades, las afecciones médicas y de apoyo para los encargados del cuidado.

### Recursos de salud y educación

Campus de St. Paul, cerca de skyway en el cuarto piso  
**651-229-3938**  
hrc@gillettechildrens.com

# Instrucciones de emergencia para la sonda gástrica (sonda G)

Educación del paciente  
EDR106-SP

Debe utilizar esta información si se sale su sonda de alimentación gástrica (sonda G).

### Si tiene menos de dos semanas la abertura del estoma:

1. Coloque una gasa con cinta adhesiva sobre la abertura del estoma.
2. Vaya a la sala de emergencias. No espere.
3. Llame a Cirugía Pediátrica al 612-626-4214.

### Si tiene entre dos y ocho semanas la abertura del estoma:

1. Use el kit de emergencia de la sonda G
2. Llame a Cirugía Pediátrica al 612-626-4214.
3. Vaya a la sala de emergencias.

\*\*Debe llegar a la sala de emergencias en el transcurso de 1 a 2 horas a partir del momento en que se salió la sonda G. Si no lo hace, la abertura empezará a cerrarse.

### Si la abertura del estoma tiene más de ocho semanas:

Si no le enseñaron en la clínica cómo cambiar la sonda G:

1. Use el kit de emergencia de la sonda G
2. Vaya a la sala de emergencias
3. Llame a Cirugía Pediátrica al 612-626-4214.

Si le enseñaron en la clínica cómo cambiar la sonda G, siga estas instrucciones:

- Si no está roto el balón, vuelva a insertar la misma sonda G.
- Si está roto el balón, inserte una nueva sonda Mic-Key.

\*\* Siempre tenga un botón Mic-Key de repuesto o un kit de emergencia para la sonda G con un catéter de Foley.

## Kit de emergencia para la sonda G

Cuando vuelva a casa le proporcionaremos los suministros que necesita en caso de que la sonda G se desplace fuera del estómago. Su kit de emergencia para la sonda G tendrá los siguientes suministros:

- Catéter de Foley de silicona con un diámetro de por lo menos dos tamaños menos (escala francesa) que la sonda G actual.

- Tapón para el extremo del catéter de Foley
- Dos jeringas con 5 ml de solución salina normal para inflar el balón del catéter de Foley de silicona
- Gel soluble en agua para lubricar el catéter de Foley
- Cinta de microespuma de 1 pulg. x 6 pulg.

## Colocación de emergencia de la sonda G

1. Lávese las manos.
2. Lave el área del estoma con un paño húmedo.
3. Abra el paquete del catéter de Foley y lubrique la punta del balón del catéter.
4. Coloque el tapón azul del catéter en el extremo grande del catéter de Foley. El tapón evita el escape del contenido del estómago después de la inserción del catéter de Foley.
5. Sostenga el catéter de Foley en una posición perpendicular al estómago.
6. Inserte con suavidad el catéter de Foley a través de la abertura del estoma. **NUNCA INTRODUZCA EL TUBO POR LA FUERZA.** Debe introducir el catéter de Foley en la abertura del estoma por lo menos una distancia igual a la de la sonda G original. Revise si hay drenaje del contenido estomacal a través del catéter de Foley. Esto indica que el catéter de Foley está en el estómago.
7. Use la válvula del balón para inflarlo con una jeringa precargada con solución salina normal. Este procedimiento no es doloroso.
8. Suavemente tire del catéter de Foley hasta que encuentre resistencia.
9. Ponga la cinta varias veces alrededor del catéter de Foley aproximadamente a 1/4 de pulgada del abdomen. Esto evita que el catéter se introduzca más en el estómago.
10. Para obtener instrucciones adicionales, llame a Cirugía Pediátrica al 612-624-4214.