

Bomba de administración de baclofen por vía intratecal complicaciones posibles

Para ciertos pacientes que tienen espasticidad, la bomba de administración de baclofen por vía intratecal ofrece muchos beneficios. El medicamento administrado por la bomba ayuda a reducir la magnitud de la espasticidad en los músculos, lo cual facilita que usted funcione y que alguien más ayude a cuidarlo. Sin embargo, cada vez que un paciente es operado o comienza a usar un medicamento nuevo hay algunos riesgos. Cuanto más sepa sobre estos riesgos más rápido se podrán identificar y tratar los problemas que surjan.

Hable inmediatamente con un médico o enfermero en Gillette si nota alguno de los síntomas enumerados aquí. Llame al enfermero de Triage de Gillette al 651-229-3890 desde las Ciudades Gemelas, o al 800-719-4040 fuera de las Ciudades Gemelas (de lunes a Viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a.m. a 4:30 p.m.). Llame a la estación de enfermería 4 Este al 651-726-2840 (después del horario regular de lunes a sábados y a cualquier hora los domingos).

Infección

Si ocurre una infección, posiblemente se desarrollará durante los dos primeros meses después de implantar la bomba. Esté atento a lo siguiente:

- Temperatura elevada
- Área de la incisión enrojecida (en el sitio de la bomba o en la espalda)
- Hinchazón en el sitio de la bomba o en la incisión en la espalda
- Calor en el sitio de la bomba o en la incisión en la espalda
- Endurecimiento en el sitio de la bomba o en la incisión en la espalda
- Drenado de cualquier incisión
- Dolor de cabeza
- Rigididad en el cuello
- Sensibilidad a la luz

Abstinencia

Estos síntomas podrían ocurrir si se reduce demasiado rápido la cantidad de medicamento que recibe por la bomba. Los síntomas incluyen:

- Picazón, hormigueo o otras sensaciones inusuales

Bomba de administración de baclofen por vía intratecal complicaciones posibles

- Dolor de cabeza
- Aumento repentino en el tono muscular, a menudo acompañado por espasmos
- Convulsiones
- Irritabilidad
- Alucinaciones (ver u oír cosas que realmente no están allí)
- Aumento de temperatura

Pérdida de líquido cefalorraquídeo

El líquido cefalorraquídeo es el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Si hay una pérdida de este líquido por la cubierta de la médula espinal los signos que podría notar son los siguientes:

- Dolor de cabeza que está presente cuando está incorporado pero que mejora o desparece cuando se recuesta
- Náuseas o vómitos

Efectos secundarios del medicamento

Esto está directamente relacionado con el baclofen. Los síntomas incluyen:

- Cambio en la función intestinal y de la vejiga
- Menor control de la cabeza o el tronco

Sobredosis

Es extremadamente raro tener una sobredosis (recibir demasiado baclofen) con una bomba de administración por vía intratecal. Los síntomas de la sobredosis incluyen:

- Hipotonía ascendente (tono muscular cada vez más bajo)
- Somnolencia
- Mareos
- Cansancio
- Depresión respiratoria (respiración lenta y superficial)
- Convulsiones
- Pérdida del conocimiento