EDR145-ES

¿Qué es una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)?

La colocación de una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG, por sus siglas en inglés) es un procedimiento en el que se inserta una sonda de alimentación flexible (comúnmente conocida como sonda PEG) a través de la pared abdominal hasta el estómago, que puede colocarse bajo guía quirúrgica o radiológica. Por lo general, se necesita otro procedimiento para convertir estos tubos en un tubo de perfil bajo aproximadamente 8 semanas después. Una sonda de gastrostomía de perfil bajo es un tipo de sonda de gastrostomía que se coloca en el estómago a través de la pared abdominal y se encuentra cerca del abdomen. Es menos voluminoso y más discreto.

Dar alimentos y medicamentos

- Haga un seguimiento con su proveedor para obtener instrucciones sobre la alimentación por sonda y la administración de medicamentos.
- SOLO use alimentos específicos diseñados para usar con su sonda G/GJ (a menos que se indique lo contrario con su proveedor).
- Enjuague la sonda al menos dos veces al día con agua o siga las instrucciones del dietista, si se las dan.
- Enjuague la sonda antes y después de administrar medicamentos y alimentarse.

This information is for educational purposes only. It is not intended to replace the advice of your health care providers. If you have any questions, talk with your doctor or others on your health care team.

If you are a Gillette patient with urgent questions or concerns, please contact Telehealth Nursing at 651-229-3890.

- Nota: La mayoría de las alimentaciones yeyunales (puerto J) se administran por un método continuo. La alimentación continua se administra con una bomba durante un período, generalmente de 12 a 24 horas, según su situación específica.

Tubo de gastroyeyunostomía de perfil bajo

Tubo de gastrostomía de perfil bajo

This information is for educational purposes only. It is not intended to replace the advice of your health care providers. If you have any questions, talk with your doctor or others on your health care team.

If you are a Gillette patient with urgent questions or concerns, please contact Telehealth Nursing at 651-229-3890.

Seguimiento

- Recomendamos cambiar la sonda de alimentación cada 3 meses. Los tubos GJ SIEMPRE se intercambian en Radiología. Comuníquese con Radiología para programar una cita de intercambio de tubos GJ. Deberá programar una cita alrededor de 8 a 12 semanas después de la colocación para convertir el PEG en una sonda de gastrostomía de bajo perfil con radiología u otro proveedor capacitado. Después de esto, los cambios de sonda de gastrostomía de perfil bajo se pueden hacer cada 2-3 meses en casa.
- Las sondas G/GJ NO PUEDEN retirarse hasta 6 semanas después de la fecha de colocación de la sonda.
- Los sujetadores/botones en T (suturas) deben retirarse de 7 a 10 días después de la colocación del tubo. Es posible que esto se haya hecho mientras todavía estaba en el hospital. También se puede completar en una clínica o centro de atención ambulatoria. Comuníquese con Cirugía/Radiología si tiene preguntas, inquietudes o para obtener instrucciones para quitarlo.

¿Cuándo consultar a mi médico?

Comunícate con tu proveedor si experimentas alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre superior a 101 °F (38.3 °C).
- Drenaje purulento (amarillo/verde/maloliente) del sitio de salida del tubo.
- Dolor abdominal significativo o que empeora.
- Piel caliente al tacto o significativamente enrojecida en el sitio de salida de la sonda.
- Sangrado en el sitio de salida de la sonda.
- El tubo se cae o se siente que está fuera de posición.
- No se puede enjuagar el tubo.
- Fugas significativas alrededor del sitio de la sonda (alimentación por sonda, medicamentos o drenaje).
- Dolor intenso en el sitio de salida de la sonda.

****NOTA:** Siga también las instrucciones específicas de los equipos de Cirugía/Radiología, ya que estas están destinadas a ser pautas generales de atención posterior a la colocación.

This information is for educational purposes only. It is not intended to replace the advice of your health care providers. If you have any questions, talk with your doctor or others on your health care team.

If you are a Gillette patient with urgent questions or concerns, please contact Telehealth Nursing at 651-229-3890.